



CROP PERU



FICHA TECNICA

Protocito

Producto

Composición

ProtoCito

Proto citoquininas:	0.200% p/v
Ácidos carboxílicos:	8% p/v
Polifenoles:	4.5% p/v
Azúcares reductores:	1.16% p/v
Extracto Ascophyllum nodosum:	5% p/v
Extracto eckonia máxima :	2.85% p/v
Aminoácidos libres :	2.6 % p/v
Zinc (ZnO) :	0.63% p/v

Clase de Uso : Bioestimulante de uso Foliar y radicular

Distribuidor : Crop Peru / Vortex Trading Company

CARACTERÍSTICAS

PROTOCITO es un fertilizante complejo que promueve e induce a la formación natural de hormonas, aminoácidos y macromoléculas a nivel de los diferentes tejidos vegetales promoviendo un balance hormonal y regulando los diferentes procesos de crecimiento y desarrollo.

PROTOCITO mejora la germinación, enraizamiento y vigor de semillas y plántulas tratadas. Reduce el stress y activa el crecimiento y desarrollo en los diferentes estados fenológicos de los cultivos.

PROTOCITO regula el crecimiento vegetativo de los cultivos tratados. Se recomienda su uso vía foliar, drench, sistema de riego u otras formas de aplicación.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Agitar fuertemente el envase antes de usar, llenar el equipo de aplicación con la mitad del agua a utilizar, vaciar la cantidad necesaria de **PROTOCITO** agitar fuertemente y luego completar con la cantidad de agua deseada.


SISTEMAS DE APLICACIÓN

PROTOCITO preferentemente debe ser aplicado a través del sistema de riego por goteo por no más de 30 minutos para mantener la concentración requerida en el sistema a la dosis recomendada. Aplicar sobre suelo regado (a capacidad de campo).

PRECAUCIONES

Protocito no es un producto tóxico, sin embargo deben observarse las siguientes precauciones:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección al viento.





CROP PERU



FICHA TECNICA

Recomendaciones de uso de *Protocito*

Cultivo	Nro Aplic.	Dosis Lt/cil	Momentos de aplicación
Arroz	2 - 3	0.2 - 0.3	Aplicar en inicio de punto de algodón. A la emisión de la panoja y en macollamiento
Cebolla y Ajo	2 - 4	0.2 - 0.3	A los 30 días del trasplante, en pre e inicio del bulbeo, en periodos de stress críticos
Papas	2 - 4	0.2 - 0.3	A la uniformidad del brotamiento antes del aporque, y durante la formación de tubérculos
Tomates	2 - 4	0.2 - 0.3	Durante el crecimiento, a la floración y al desarrollo de frutos
Paprika, Pimiento y capsicums	3 - 4	0.2 - 0.3	Durante el crecimiento vegetativo, al inicio de la floración, al desarrollo del primer piso floral y al desarrollo del segundo piso floral.
Algodón	2 - 3	0.2 - 0.3	Durante el crecimiento vegetativo, y en floración.
Vid, Manzana y Caducifolios	3 - 4	0.2 - 0.3	Al brotamiento, durante el crecimiento vegetativo, al inicio de floración y durante el crecimiento de frutos.
Cítricos, paltos y Siempre verdes	3 - 4	0.2 - 0.3	Al inicio del brotamiento, floración y durante el crecimiento inicial de frutos.
Alcachofas	3 - 4	0.2 - 0.3	En inmersión de trasplante durante el crecimiento vegetativo en floración y al desarrollo de capítulos.
Caña de Azúcar	1 - 2	0.2 - 0.3	Al crecimiento vegetativo y al macollamiento
Espárragos y Hortalizas	2 - 3	0.2 - 0.3	Durante el crecimiento vegetativo al cambio de color de follaje en cada brote
Frejol, holantao y otras leguminosas	2 - 3	0.2 - 0.3	Durante el crecimiento vegetativo a la floración y al crecimiento de vainas
Brócoli, col y Coliflor	2 - 3	0.2 - 0.3	A los 15 días del trasplante, en pre floración y Post floración

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398
ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (Opción 4)

