



CROP PERU



FICHA TECNICA

SAR P-K

Producto : SAR P-K

Composición :	Fósforo (P ₂ O ₅)	40% p/v
	Potasio (K ₂ O)	20% p/v
	Extractos de algas marinas	15% v/v
	Densidad	1,278 g/cc
	pH	<2.0

Clase de Uso : Bioestimulante Inductor de Resistencia


Distribuidor : Crop Peru / Vortex Trading Company

CARACTERISTICAS:

SAR P-K es un Bioestimulante líquido en base a Fosfito de Potasio, esto lo hace ser un inductor de resistencia adquirida (SAR), lo que permite aumentar la resistencia a todo tipo de estrés, además posee actividad sobre el crecimiento de raíces. Actúa estimulando el metabolismo de la planta y equilibra sus funciones fisiológicas a nivel de células, desarrollando su potencial productivo frente al estrés climático y biótico (hongos) que pueda presentar la planta.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Estimula lignificación y crecimiento de raíces.
- Almacenamiento y transferencia de Energía.
- Amplio espectro de acción.
- Actúa como promotor de las defensas de las plantas y mejora la resistencia a enfermedades.
- Contiene 15 % de extracto de algas marinas.
- Acción sistémica.
- Se puede usar vía foliar.
- Prolongado efecto.
- Excelentes resultados a bajas dosis.






CROP PERU



FICHA TECNICA

USO Y RECOMENDACIONES DE SAR P-K

CULTIVOS	FOLIAR			MOMENTOS DE APLICACIÓN
	L/HA	L/200 L	ml/20L	
Café	2	0.5	100	Al inicio de la floración.
Tomate, ají paprika, pimiento	2	0.5 -- 1	50	Al inicio de la floración. Al desarrollo del fruto, repetir cada 15 días después de cada cosecha.
Cebolla, ajos	2	0.5 - 1	50	Al inicio de la formación del bulbo. Durante el llenado del bulbo cada 15 días.
Mandarina, tangelo, limón, naranja	2	0.5	100	Al inicio de la floración. Durante el crecimiento del fruto.
Esparrago	2	0.5	100	A los 60 días después de la cosecha, cada 15 días.
lechuga, brócoli, zanahoria, coliflor	2	0.5 - 1	50	Durante el crecimiento vegetativo con una frecuencia de 10 días.
Frijol, arveja, holantao	2	0.5 - 1	50	Al inicio del cuajado. En pleno crecimiento y llenado de las vainas, repetir cada 15 días.
Papa	2 -- 3	0.5 - 1	100	A los 15 días después del brotamiento Repetir 2 a 3 veces durante el crecimiento del tubérculo.
Melón, zapallo, sandia, pepinillo	2 - 3	0.5 - 1	100	Al inicio de la floración femenina. Al desarrollo del fruto, repetir con intervalos de 12 a 15 días.
Manzano, palto, melocotón, lúcumo	2 - 3	0.5	100	Antes de la floración. A la caída de pétalos. Crecimiento del fruto.
Vid	2 - 3	0.5	100	Antes de la floración Al inicio del crecimiento del racimo.





CROP PERU



FICHA TECNICA

SISTEMAS DE APLICACIÓN

SAR P-K se recomienda ser aplicado por vía foliar pulverizado con equipos de fumigación, (cuando se utilice atomizadores duplicar la dosis indicada) y también aplicar por los sistemas de riego tecnificado (goteo, aspersión, etc.) a una dosis de 2 a 4 l/ha.

TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO

SAR P-K no es tóxico es respetuoso con el medio ambiente. En caso de ingestión del producto acuda al médico.

COMPATIBILIDAD

SAR P-K es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios comunes, no se debe hacer mezclas con soluciones muy acidas, aceites y azufres. El producto es biodegradable no está sujeto a ninguna consideración toxicológica, tanto transporte como de almacenamiento.

FITOTOXICIDAD

No se ha detectado fitotoxicidad en los cultivos recomendados cuando se emplea en la dosis indicada

REGISTROS Y TOLERANCIAS DE RESIDUOS

Este punto no es aplicable a este producto por estar dentro de la categoría de fertilizante foliar.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel: quitarse la ropa contaminada y lavar el área afectada con agua y jabón por lo menos 15 minutos. Buscar atención médica si la irritación persiste.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Buscar atención médica si la irritación persiste.
- En caso de inhalación, puede causar irritación a las membranas de las mucosas. Trasládala la víctima al aire fresco.
- En caso de ingestión, puede causar irritación a las membranas de las mucosas. NO INDUCIR AL VOMITO. Busque atención médica si la irritación o los síntomas persisten.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398
ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (Opción 4)

