



**CROP PERU**



**FICHA TECNICA**

## Radical Booster

Producto : Radical Booster

Composición :	Extractos de Origen vegetal diluyentes y acondicionadores	95,795 % p/v
	L - Triptófano (Aminoácidos)	4,05 % p/v
	Auxinas	1500 ppm
	Citoquininas	50 ppm
	Densidad	1,145 g/cc
	pH	6.5

Clase de Uso : Bioestimulante para el crecimiento radicular


Distribuidor : Crop Peru / Vortex Trading Company

### CARACTERISTICAS

**Radical Booster** es un Bioestimulante derivado de extractos vegetales (plantas, algas y semillas) las cuales son ricas en Auxinas y Citoquininas, además contiene L-Triptófano aminoácido importante en la inducción del desarrollo radicular. Producto orientado a estimular el crecimiento y calidad de raíces. Puede ser aplicado en riego por goteo, Drench y foliar.

### USO Y RECOMENDACIONES DE RADICAL BOOSTER

CULTIVO	DOSIS (L/HA)	MOMENTO DE APLICACION
Vid	1 - 5	Pre floral o post cosecha cuando la planta haya definido su ciclo de emisión de raíces. Aplicar hasta 4 veces por ciclo
Palto, melocotón, mango	1 - 5	Aplicar una vez definido el ciclo de emisión de raíces. Aplicar a la banda en la línea de la copa de árbol. Aplicar un máximo de 4 aplicaciones por ciclo
Cítricos	1 - 3	Aplicar una vez definido el ciclo de emisión radicular (Fase vegetativa). Puede ser aplicado a la banda y por vía folia en pre floración y/o post cosecha





CROP PERU



# FICHA TECNICA

Arándanos, fresa	1 - 2	Aplicar desde establecido el cultivo. Aplicar dosis menores cuando el sistema radicular es menor y dosis mínima para mantener el equilibrio radicular. Aplicar un máximo de 4 aplicaciones por ciclo
Tomates, ají, pimientos	1 - 2	Aplicar una vez establecido el cultivo en el campo. Aumentar dosis luego de iniciar los cortes. Dirija la aplicación a la base de las plantas. Aplicar por riego presurizado o por vía foliar. Aplicar un máximo de 4 aplicaciones por ciclo
Cebolla, ajos	1	Aplicar a la base del cuello antes o después de trasplante. Aplicar un máximo de 2 aplicaciones por ciclo
Ajo, papas	0,5 - 5	Aplicar luego de la emergencia de plantas con a lo menos 2 hojas verdaderas. Dirigir aplicaciones a la base de la planta o vía foliar. Aplicar un máximo de 2 aplicaciones por ciclo
Maíz	0,5	Aplicar luego de la emergencia junto a programa foliar cuando la planta a lo menos cuente con un mínimo de 3 hojas verdaderas y un máximo de 6
Cucurbitáceas ( Melones, sandías, zapallos y pepinos)	0,5	Aplicar una vez establecido el cultivo en el campo. Repita una vez iniciado los cortes a una dosis mayor. Dirija la aplicación a la base de la planta

## INSTRUCCIONES DE USO

- No aplicar con temperaturas inferiores a 15 grados y no mayores a 28 grados
- No aplicar con follaje húmedo, viento, ni ante la posibilidad de lluvias.
- Se debe utilizar un mojamiento tal que permita cubrir de manera uniforme y homogénea el sector a tratar.
- La mezcla debe ser utilizada el mismo día de su preparación.
- De uso por vía foliar y fertirriego

## TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO

**Radical Booster** es considerado no tóxico para las plantas y animales. Por lo tanto, para el manejo del producto es necesario atenerse a las precauciones de uso del producto fitosanitario, con el cual sea mezclado este Bioestimulante.





**CROP PERU**



**FICHA TECNICA**

### **COMPATIBILIDAD**

*Radical Booster* es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos de acción neutra y acida. No mezclar con productos de acción alcalina.

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de proceder a su mezcla con otros productos.

### **PRECAUCIONES**

*Radical Booster* no es un producto tóxico, sin embargo deben observarse las siguientes precauciones:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección al viento.
- Almacenar en un lugar frío y con buena ventilación. Evitar que permanezca en el sol por un periodo prolongado.

### **PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de contacto con la piel: quitarse la ropa contaminada y lavar el área afectada con agua y jabón por lo menos 15 minutos. Buscar atención médica si la irritación persiste.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos manteniéndolos párpados abiertos. Buscar atención médica si la irritación persiste.
- En caso de inhalación, puede causar irritación a las membranas de las mucosas. Trasládala la víctima al aire fresco.
- En caso de ingestión, puede causar irritación a las membranas de las mucosas. NO INDUCIR AL VOMITO. Busque atención médica si la irritación o los síntomas persisten.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA  
CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398  
ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (Opción 4)

