



CROP PERU



FICHA TECNICA

Sargeklon Synergy

Producto : Sargeklon Synergy

Composición :

Extractos de Algas Marinas:

<i>Ecklonia maxima</i>	50 % v/v
<i>Ascophyllum nodosum</i>	50 % v/v

Fitohormonas Biológicamente activas:

Giberelinas	20 ppm
(Equivale a 0,1 g/l/0,01 %)	
Auxinas	20 ppm
(Equivale a 0,1 g/l/0,01 %)	
Citoquininas	40 ppm
(Equivale a 0,2 g/l/0,02%)	


Macro y Microelementos:

Manganeso (Mn)	1,4%
Zinc (Zn)	3,0%
Magnesio (Mg)	1,2%
Boro (B)	0,6%
Azufre (S)	4,5%
Cobre (Cu)	1,3%
Calcio (Ca)	0,25%
Nitrógeno (N)	0,6%
Densidad	1,276 g/cc
pH	2.3

Clase de Uso : Bioestimulante de crecimiento
Distribuidor : Crop Peru / Vortex Trading Company

CARACTERISTICAS

Bioestimulante sistémico formulado a base de extracto de alga marinas (*Ascophyllum nodosum* y *Ecklonia máxima*), conteniendo sustancias como el manitol y el ácido alginico, que contribuyen en la absorción y translocación de nutrientes, además aminoácidos, micronutrientes y fitohormonas, lo que permite a la planta salir fácilmente de los momentos de estrés y ser utilizado en los requerimientos de aumento de calibre de fruto.






CROP PERU



FICHA TECNICA

USO Y RECOMENDACIONES DE **SARGEKLON SYNERGY**

CULTIVO	Dosis cc/200 L	MOMENTO DE APLICACION
Cebolla, ajo, lechuga, brócoli	250-500	Al haber 2 a 5 pares de hojas y 10-15 días después
Papaya	250	Iniciar aplicaciones al comenzar la floración, repetir cada 7 días
Fresas, Arándanos	250-500	Inicios de la floración y repetir cada 3-4 semanas
Tomate, pimiento, leguminosas y cucurbitáceas	250-500	Al inicio de la floración y repetir a la aparición de frutos
Arroz, maíz	250-500	Al inicio del macollamiento Al segundo nudo
Melocotón, manzano, granada	250	Durante la floración y hasta la caída de pétalos
Uva sin semilla	750 cc/ 1000 l agua	Al inicio, 50% y al 80% de la floración. Cuarta aplicación cuando las bayas tengan 6-8 m, quinta aplicación 5 días después y sexta otros 5 días después
Uva con semilla	2 l/1000 l agua	Al inicio de floración y a las 3-4 semanas
Banano	250	En siembras nuevas iniciar aplicaciones a los 40 días de la emergencia de plantas
Piña	250	A los 30-45 días del trasplante Repetir a los 60-90 días
Mango, palto, mandarina	500 cc/Cil a 2l/1000 l agua	Dos semanas después del inicio de floración hasta la caída de pétalos
Papa, camote	250-500	Al inicio de formación de tubérculo y repetir a los 15-30 días
Alfalfa	500	Aplicar cuando la planta tenga 10-15 cm de altura y repetir a las 10-20 hojas después de cada corte





CROP PERU



FICHA TECNICA

TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO

Sargeklon Synergy no es tóxico por ser de origen vegetal, por lo que no hay riesgo por ingestión, inhalación, contacto dérmico u ocular. No se almacene ni transporte junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

COMPATIBILIDAD

Sargeklon Synergy es compatible con todos los agroquímicos de acción neutra; sin embargo, se recomienda hacer una pequeña prueba de compatibilidad antes de proceder a su mezcla con otros materiales. No mezclar con aceites, ni productos fosfatados.

FITOTOXICIDAD

Sargeklon Synergy no es fitotóxico cuando es aplicado de acuerdo con las instrucciones de uso.

SISTEMAS DE APLICACIÓN


Agítese muy bien antes de usarse y lávese los residuos con agua limpia, vertiéndose los mismos al tanque.

Sargeklon Synergy debe ser mezclado en suficiente agua para obtener un buen cubrimiento del follaje. Puede ser aplicado con equipo terrestre o aéreo.

PRECAUCIONES

Sargeklon Synergy no es un producto tóxico, sin embargo deben observarse las siguientes precauciones:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección al viento.
- Almacenar en un lugar frío y con buena ventilación.
- Evitar que permanezca en el sol por un periodo prolongado.





CROP PERU



FICHA TECNICA

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel: quitarse la ropa contaminada y lavar el área afectada con agua y jabón por lo menos 15 minutos. Buscar atención médica si la irritación persiste.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos manteniéndolos párpados abiertos. Buscar atención médica si la irritación persiste.
- En caso de inhalación, puede causar irritación a las membranas de las mucosas. Traslada la víctima al aire fresco.
- En caso de ingestión, puede causar irritación a las membranas de las mucosas. NO INDUCIR AL VOMITO. Busque atención médica si la irritación o los síntomas persisten.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398
ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (Opción 4)

